

**Anlage 3**  
zum RdErl. v. ....

**Saatgutmischungen zur Anlage von Blüh- und Schonstreifen  
oder Blüh- und Schonflächen**

|  |                            | A                      |                                       | B             |  |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
|  |                            | einsömrig bis 2-jährig |                                       | mehrjährig    |  |
| Saatzeit   |                            | April/Mai              |                                       | April/Mai     |  |
| Saatstärke   |                            | 10 - 20 kg/ha          |                                       | 10 - 35 kg/ha |  |
| Mindestanzahl  |                            | 12                     |                                       | 12            |  |
|  | Deutsche Bezeichnung       |                        |                                       |               |  |
| <b>Gräser</b>  | Glatthafer                 |                        |                                       | x             | 2 - 65 % und<br>mindestens 2<br>Arten  |
|  | Knautgras                  | x <sup>1</sup>         | 0 - 5 %                               | x             |  |
|  | Wiesenschneggras           |                        |                                       | x             |  |
|  | Rohrglanzgras              | x <sup>1</sup>         | 0 - 5 %                               | x             |  |
|  | Rotschwingel               |                        |                                       | x             |  |
|  | Wieserispe                 |                        |                                       | x             |  |
|  | Wiesenschwingel            |                        |                                       | x             |  |
| <b>Zwischenfrüchte</b>   | Gelbsenf                   | x                      | 15 - 70 %<br>und min. 5<br>Arten      | x             | 10 - 25 % und<br>mindestens 4<br>Arten |
|  | Öllein                     | x                      |                                       | x             |  |
|  | Ölrettich                  | x                      |                                       | x             |  |
|  | Phacelia                   | x                      |                                       | x             |  |
|  | Sonnenblume                | x                      |                                       | x             |  |
|  | Sommerraps                 | x                      |                                       | x             |  |
|  | Winterraps                 | x <sup>1</sup>         |                                       | x             |  |
|  | Herbstrübe                 | x                      |                                       | x             |  |
|  | Winterrüben                | x <sup>1</sup>         |                                       | x             |  |
|  | Ramtillkraut               | x                      |                                       | x             |  |
|  | Borretsch                  | x                      |                                       | x             |  |
| <b>Leguminosen,<br/>einjährig</b>  | Alexandrinertel            | x                      | 5 - 60 %<br>und min. 4<br>Arten       | x             | 0 - 20 %                               |
|  | Futtererbse                | x                      |                                       | x             |  |
|  | Inkarnatkelch              | x                      |                                       | x             |  |
|  | Lupine                     | x                      |                                       | x             |  |
|  | Perserkelch                | x                      |                                       | x             |  |
|  | Saatwicke                  | x                      |                                       | x             |  |
|  | Serradella                 | x                      |                                       | x             |  |
|  | Zottelwicke                | x                      |                                       | x             |  |
| <b>Leguminosen,<br/>mehrjährig</b>   | Rotkelch                   | x                      | 5 - 25 % und<br>mindestens 2<br>Arten | x             | 5 - 25 % und<br>mindestens 2<br>Arten  |
|  | Espartette                 | x                      |                                       | x             |  |
|  | Gelbkelch                  |                        |                                       | x             |  |
|  | Hornschotenkelch           |                        |                                       | x             |  |
|  | Schwedenkelch              |                        |                                       | x             |  |
|  | Blaue Luzerne              |                        |                                       | x             |  |
| Weißkelch  |                            | x                      |                                       |               |  |
| <b>Wildfutterpflanzen</b>  | Buchweizen (nicht steril)  | x                      | 0 - 30 %                              | x             | 0 - 30 %                               |
|  | Futterkohl (Markstammkohl) | x <sup>1</sup>         | 0 - 3 %                               | x             | 0 - 3 %                                |
|  | Waldstaudenroggen          | x <sup>1</sup>         | 0 - 30 %                              | x             | 0 - 30 %                               |
|  | Hafer                      | x                      |                                       | x             |  |
| <sup>1</sup> nur bei überjähriger und zweijähriger Nutzung. Diese Arten dienen der Winterbegrünung sowie dem Winterhabitat für Wildtiere und Wildinsekten oder gelangen erst im zweiten Jahr zur Blüte |                            |                        |                                       |               |  |