


Abbildung:

"Behandlungsansprüche" der Wintertriticalesorten (3 Jahre 2005, 2006, 2007)

absteigend sortiert nach Bereinigter Marktleistung (relativ) - Mittel aus den jeweils besten Behandlungsvarianten B1, B2



Erläuterung der Abbildung

Von jeder Sorte wurde von jedem einzelnen LSV-Standort aus den letzten drei Jahren die entweder in der B1- oder in der B2-Intensitätsstufe vorliegende höchste bereinigte Marktleistung herangezogen und gemittelt, dargestellt durch die Säulen im Diagramm. Die jeweils der höchsten Marktleistung zugeordnete Intensitätsstufe als Ziffer – 1 oder 2 – wurde ebenfalls gemittelt. Sie ergibt den Behandlungsindex, die Punktemarkierung im Diagramm. Wenn in einem Versuchsjahr also überwiegend aus der Behandlungsstufe B1 die höchste bereinigte Marktleistung bei einer Sorte erzielt wurde, ergibt sich ein niedriger Behandlungsindex beziehungsweise ein Behandlungsanspruch von 1,1 bis 1,4. Wenn sich dieses über mehrere Jahre bei der gleichen Sorte so zeigt, lässt sich tendenziell ableiten, dass diese Sorte insgesamt eine niedrigere Behandlungsintensität benötigt, um die höchsten bereinigten Marktleistungen zu erzielen.

jen und
index,
iedriger
»